



## 1. Conditions

- Réaliser si possible au moins une heure après la dernière miction et toujours avant le premier jet d'urine en recueillant le pus ou l'écoulement au méat urétral (Remic, 2010).

## 2. Matériels

- Ecouillons adaptés aux analyses recherchées (cf. catalogue des examens : <http://chms.manuelprelevement.fr/>).
- Gants non stériles
- Pour la recherche de Chlamydiae par PCR, faire un premier jet d'urine MO-C1-LBM-024 Recueil premier jet d'urine

## 3. Mode opératoire

- Réaliser une désinfection des mains selon le mode opératoire en vigueur MO-G7-LBM-004-Mains : Hygiène
- Mettre des gants non stériles
- Allonger le patient sur le dos ou le faire s'asseoir (Vous pouvez lui demander de mettre ses mains sous ses fesses pour éviter des mouvements de bras gênants).
- Maintenir le sexe d'une main et introduire l'écouvillon humidifié avec de l'eau stérile dans l'urètre de 2 à 4 cm, tourner l'écouvillon pendant 3 à 5 secondes puis retirer le délicatement. Cette action est à répéter en fonction du nombre d'écouvillons nécessaires
- Enlever les gants
- Réaliser une désinfection des mains selon le mode opératoire en vigueur MO-G7-LBM-004-Mains : Hygiène