1. Matériel

Pour le dépistage de *S. agalactiae*

- 1 écouvillon simple (cf. catalogue des examens http://chms.manuelprelevement.fr/)

Pour la recherche bactériologique classique (tous germes)

- 1 speculum
- 1 pince à asepsie
- 2 écouvillons (1 simple et 1 avec milieu de culture)
- Compresses
- Si recherche de *Mycoplasma* demandé :
    - 1 écouvillon +/- mileu de transport dédié ou non selon l'établissement
- Si recherche de *Chlamydiae*
    - 1 écouvillon spécifique

2. Mode opératoire

Préparation

- Réaliser une désinfection des mains selon le mode opératoire en vigueur MO-G7-LBM-004-Mains : Hygiène
- Mettre des gants

Réaliser les prélèvements en fonction de la demande :

Pour le dépistage de *S. agalactiae*

- Ecouvillonner sur l'ensemble de la cavité vaginale incluant le balayage des parois de la moitié inférieure du vagin jusqu'au vestibule (ANAES 2001).

Pour la recherche bactériologique classique (tous germes)

- Mettre le spéculum si nécessaire.
- Retirer les mucosités excédentaires à l'aide de compresses si nécessaire.
- Jeter les compresses.

- Prélever les 2 écouvillons (1 simple et 1 avec milieu de culture)
- Si recherche de ***Mycoplasma***
    - Prélever au niveau de l'endocol-exocol à l'aide d'un nouvel écouvillon – décharger l'écouvillon dans le milieu de transport (selon établissement)
- Si recherche de ***Chlamydiae*** **:**
    - Introduisez dans le canal endo-cervical l'écouvillon adapté puis tourner 3 fois l'écouvillon.

Finir le prélèvement

- Retirer le spéculum (si utilisé)
- Enlever les gants
- Réaliser une désinfection des mains selon le mode opératoire en vigueur MO-G7-LBM-004-Mains : Hygiène